

## آمادگی برای اسکن قلب

گاما اسکن نیکان - تهران - خیابان ولیعصر - بین میدان ونک و پل هوایی شهید همت - شماره ۲۵۳۴

این اسکن بنا بر درخواست پزشک معالج شما جهت بررسی وضعیت خون‌رسانی به ماهیچه قلب (میوکارد) انجام میشود. به این منظور در روز مراجعه ابتدا در حضور متخصص قلب این مرکز نوار قلب و فشارخون شما ثبت و سپس مورد انجام تست ورزش یا تزریق دارو قرار گرفته و بعد از آن پرتوداروی قلب از رگ جلوی آرنج تزریق میشود. بعد مدتی منتظر میمانید تا پرتودارو جذب ماهیچه قلب گردد. سپس با قرار گرفتن زیر دستگاه وضعیت خونگیری قلب شما در نماهای مختلف به تصویر در می آید. مقدار پرتوداروی تزریقی در حد مجاز و بدون خطر است. در نوبت دوم مراجعه بعد از تزریق تصویر برداری مجدد انجام شده و نتایج دو مرحله با یکدیگر مقایسه و گزارش میشود.

- برای انجام این اسکن باید **دو نوبت** مراجعه نمائید. نوبت اول ۲-۴ ساعت طول میکشد. وقت تعیین شده تقریبی است و با توجه به شرایط بیماران مختلف امکان طولانی تر شدن آن وجود دارد.
- داشتن **یک نفر همراه** الزامیست. از همراه آوردن بیش از یک نفر و کودکان و خانمهای باردار جدا خودداری شود.
- **۲ تا ۴ ساعت** قبل از مراجعه چیزی نخورید.
- شب قبل از انجام اسکن **حتما حمام کنید**. تراشیدن موهای سینه برای آقایان الزامیست. وجود چربی پوست بدن و موهای بلند روی سینه تست شما را خراب خواهد کرد.
- پیراهن **گشاد جلوباز** بپوشید.
- **سوابق پزشکی** خود (نوار قلب - تست ورزش - اکوکاردیوگرافی - آنژیوگرافی - خلاصه پرونده بستری) را همراه داشته باشید. آنها را منظم داخل یک پوشه قرار دهید.
- در صورت وجود سابقه **آسم یا برونشیت یا بیماریهای مزمن ریه** قبل از انجام اسکن اطلاع دهید.
- مصرف بعضی داروها یا خوراکی ها بعلا تداخل مانع از جواب صحیح میشود و **باید طبق جدول زیر قطع شود**. در مورد زمان قطع آنها با پزشک خود نیز مشورت کنید.

دوبونامین	دیپیریدامول	تست ورزش	دارو - خوردنی ها
قطع	قطع	قطع	TNG نیتروکانتین - سوستاک - آدالات از ۱۲ ساعت قبل
قطع	قطع	قطع	آنتولول - پروپرانولول - متورال - سوتالول - کارویدلول - متوپرولول از ۲۴ ساعت قبل
قطع	قطع	قطع	آملودیپین - آملوپرس - دیلتیازم - وراپامیل از ۴۸ ساعت قبل
	از صبح روز تست ممنوع		نوشابه - نوشیدنیهای انرژی زا
	از صبح روز تست ممنوع		چای - قهوه - نسکافه - کاکائو - شکلات - بستنی قهوه ای و شکلاتی
	قطع	قطع	دی پیریدامول - آدالات - ایزوسورباید - ایزوردیل از ۴۸ ساعت قبل
	قطع		تئوفیلین - آمینوفیلین روز انجام تست
			پلاویکس - اسویکس - زیلت - کلپیدوگرل - لوزار - والزارتان - کاپتوپریل - انالاپریل - هیدروکلروتیازید - تریامترن اچ - آس آ - اسپیرین

- لطفا در صورت انصراف از انجام اسکن ۲۴ ساعت قبل مرکز را مطلع بفرمائید. شماره تلفن ۸۸۷۷۳۹۹۰ و ۸۸۲۰۷۳۱۰ این مرکز پاسخگوی سؤالات شما میباشد - با آرزوی سلامتی از همکاری شما متشکریم.